


El Dengue ha surgido recientemente como uno de los principales problemas de salud pública en el mundo.

Las epidemias de Dengue determinan, por su rápida extensión y larga duración, la reducción de la capacidad productiva y del desarrollo económico de todos los segmentos de la población, determinando la sobrecarga del sistema de atención de Salud que puede conducir al colapso institucional.

Expansión en América



REINFESTACIÓN *Aedes aegypti* en Bolivia

- Bolivia con la ayuda de la Fundación Rockefeller en 1932, inicia una campaña destinada a la erradicación del *Aedes aegypti*, en 1948 se logro el objetivo de ser el primer país de las América de declararse libre del Vector. (Soper, 1963; Smith & Downs, 1983).



En febrero de 1980, se detectó una reinfestación de *Aedes aegypti* en la ciudad de Santa Cruz y las poblaciones rurales de Montero, La Guardia y Jorochito, desplazándose a otras provincias y en otros departamentos como el trópico de Cochabamba, Tarija (1985), Beni, Pando (1988).

INTRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN VIRAL DEL DENGUE EN BOLIVIA

? 1987 – 1988 Dengue tipo 1

? 1996 Dengue tipo 2 (3 casos)

? 2002 Circulación Dengue tipos 1 y 2

? 2007 Dengue 2 y 3

En Bolivia Durante el primer semestre del año 2009, se han reportado 66,224 casos de dengue.....casos de dengue hemorrágico y 17 fallecidos.